

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷七十

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣

朱鈐

校對官學正臣

翁樹棠

謄錄監生臣

羅善慶

欽定四庫全書

證治準繩卷七十

明 王肯堂 撰

女科

產後門

瘧

妻產後瘧疾多由汚血挾寒熱而作大法宜柴胡四物
湯調之熱多者草果飲子寒多者生熟飲子 薛產後

瘧疾因脾胃虛弱飲食停滯或因外邪所感或鬱怒傷脾或暑邪所伏審係飲食用六君加桔梗蒼朮藿香如外邪多而飲食少用藿香正氣散如外邪少而飲食多用人參養胃湯飲食勞役用補中益氣湯氣血虛弱用十全大補加炮薑虛寒用六君加薑桂元氣脫陷急加附子大凡久瘧多屬元氣虛寒蓋氣虛則寒血虛則熱胃虛則惡寒陰火下流則寒熱交作或吐瀉不食腹痛煩渴發熱譫語或手足逆冷寒戰如慄雖見百證當峻

术煎膏佐以歸脾湯百餘劑而瘥 一產婦朝寒暮熱
或不時寒熱久不愈用六君子補中益氣兼服百餘劑
而尋愈

草果飲子 治婦人產後瘧疾寒熱相半者或多熱者
宜此

半夏湯赤茯苓 甘草炙 草果泡去皮 川芎 陳皮

白芷各二錢 青皮去白 良薑 紫蘇各二錢 乾葛四錢

右十一味㕮咀每服三錢水一大盞薑三片棗二个

溫補其病自退若誤用清脾截瘧之類多致不起一
產婦患瘧發熱作渴胸膈脹滿遍身作痛三日不食嘔
酸噯氣此是飲食所傷脾胃不能消化用六君加神麩
山查四劑而不作酸乃去神麩山查又數劑而飲食進
其大便不通至三十五日計進飲食七十餘碗腹始悶
令用豬胆汁導而通之其糞且不甚燥一產婦患瘧
久不愈百病蜂起其脈或洪大或微細或弦緊或沉伏
難以名狀用六君加炮薑二十餘劑脈證稍得又用參

胃湯 久而不已者七寶飲截之

方並見
雜病瘡

蓐勞

夫產後蓐勞者此由生產日淺血氣虛弱飲食未平復不滿日月氣血虛羸將養失所而風冷客之風冷搏于氣血則不能溫于肌膚使人虛乏勞倦乍卧乍起顏色憔悴食飲不消風冷邪氣而感于肺肺受微寒故咳嗽口乾遂覺頭昏百節疼痛榮衛受了風邪流注臟腑須臾頻發時有盜汗寒熱如瘧背膊煩悶四肢不舉沉重

同煎至七分去滓當發日侵早連進三服無有不安
生熟飲子 治產後瘧疾多寒者

肉苳蔻 草果仁 厚朴 生去粗皮 半夏 陳皮 甘

草 大棗 去核 生薑

右八味等分細剉和勻一半生一半用濕綿紙裹煨
令香熟去紙與一半生者和勻每服秤五錢重水二
盞煎至七分食前一服食後一服

補遺產後瘧疾熱多寒少者清脾湯 寒多熱少者養

調用八珍湯倍加白朮若因脾虛血燥皮膚瘙癢用加
味逍遙散大抵此證多因脾胃虛弱飲食減少以致諸
經疲憊而作當補脾胃飲食一進精氣生化諸臟有所
倚賴其病自愈矣仍參虛煩發熱方論主治 汪一婦
產未滿月因怒氣血流如水三日方止隨又勞苦四肢
無力睡而汗出日晡潮熱口乾五心如炙諸醫皆用柴
苓蒲荷之類其熱愈熾診其脈弦大無力此蓐勞也以
四物湯一兩入胡黃連秦艽青蒿各半錢數服熱退身

着床此則蓐勞之候也 又曰婦人因產理不順疲極筋力憂勞心慮致令虛羸喘乏寒熱如瘧頭痛自汗肢體倦怠咳嗽痰逆腹中絞刺名曰蓐勞 薛按前證當扶養正氣為主用六君子湯加當歸若脾肺氣虛而咳嗽口乾用補中益氣加麥門五味若因中氣虛而口乾頭暈用補中益氣加蔓荊子若肝經血虛而肢體作痛用四物參朮若因肝腎虛弱而自汗盜汗寒熱往來者用六味丸加五味子若因脾虛血弱肚腹作痛月經不

豬腰子粥 治蓐勞發熱 用豬腰子一枚去白膜切
作柳葉片以鹽酒拌先用粳米一合入葱椒煮粥鹽
醋和將腰子鋪盤底以熱粥蓋之如作盒生狀空心
溫服

人參鼈甲散 治蓐勞皆由在產內未滿百日體中虛
損血氣尚弱失於將理或勞動作傷致成蓐勞其狀
虛羸乍起乍卧飲食不消時有咳嗽頭目昏痛發歇
無常夜有盜汗寒熱如瘧背膊拘急沉困在床服此

涼後以黃連八珍丸一料而安

石子湯 療產後虛羸喘乏乍寒乍熱如瘧四肢疼痛
面色痿黃名曰蓐勞

豬石子

一雙去脂
膜四破

香豉

一方無此
有知母

葱白

切
粳米

當歸

芍藥

各二
兩

右六味㕮咀分兩劑每劑用水三升煮取一小椀去
滓分三服 廣濟無芍藥有人參

增損柴胡湯

見前往
來寒熱

許仁則療產後日淺久坐視聽言語多或運用氣力遂覺項膊肢節皮肉痛乍寒乍熱此為蓐勞

豬腎

一雙去脂膜四破

當歸

芍藥

生薑

各二兩

葱白切

桂心

各一兩

右六味水八升煮腎取六升下藥煮取二升分溫二服

熟地黄散

見前往來寒熱

白茯苓散

治蓐勞緣生產日淺久坐多語運動用力

大効

人參 桂心 當歸 桑寄生 白茯苓 白芍

藥 桃仁 麥門冬去心 熟地黄 甘草各半兩 續斷

二錢半 牛膝七錢半 鼈甲 黃芪各一兩

右十四味為細末每服先以猪腎一對去筋膜以水
兩大盞生薑半分棗三枚煎至一盞去猪腎薑棗然
後入藥末二錢葱白三寸烏梅一箇荆芥五穗煎至
七分去滓空心晚食前溫服此藥神妙

氣所搏經候不調或寒熱羸瘦

白芍藥 當歸 五加皮 地骨皮 人參

各半兩

沒藥

桂心

各二錢

牡丹皮

三錢

右八味為細末每服二錢水酒各半盞如不飲酒只用水一盞開元錢一枚麻油蘸之同煎七分去滓通口服煎不得攪喫不得吹

黃芪煮散 治產後蓐勞肌膚黃瘦面無顏色或增寒

壯熱四肢痠疼心煩頭痛

致頭目四肢疼痛寒熱如瘧狀宜此

白茯苓

一兩

當歸

川芎

桂心

白芍藥

黃芪

人參

各半兩

熟乾地黄

一兩

右八味㕮咀先以水二盞入猪腎一隻去脂膜切薑三片棗三枚煎一盞去三物入藥半兩煎七分去滓食前分溫三服

黃芪丸

見往來寒熱

胡氏牡丹散

治產後虛羸發熱自汗欲變蓐勞或血

黃芪

炒肉桂

各一兩

白芍藥

炒二兩

甘草

炒七錢

右四味每服五錢薑棗水煎服日二三服虛甚者加

附子

紫河車丸治蓐勞及產後虛弱大効猫犬產兒即食其

胞衣故無產疾

方見虛勞

虛羸

產寶云產後虛羸者皆由產後虧損血氣所致須當慎起居節飲食六淫七情調養百日庶保無疾若中年及

鼈甲

醋炙

黃芪

各一兩

桂心

當歸

桑寄生

白朮

苓

白芍藥

人參

熟地黃

麥門冬

去心

甘草

炙各半兩

牛膝

七錢半

右十二味為細末每服用猪石子一對去脂膜切破

先以水一盞入薑半分棗三枚煎至七分去石子薑

棗却下藥五錢更煎至四分去滓空心晚食前溫服

二滓併煎

黃芪建中湯

治產後諸虛不足發熱或惡寒腹痛

皮三分

右六味水煎服如有寒加乾薑三分茯苓一錢

保命三元湯治產日久虛勞而脈浮大者即小柴胡合

四物也

治產後日久虛勞鍼灸不効者三合散

此四君子四物小柴胡三方合

和是也

白朮 川當歸 芍藥 黃芪 茯苓 熟地黃

各一兩 柴胡 人參 各一兩半 黃苓 半夏 甘草 各六錢

難產者毋論日期必須調養平復方可涉喧否則氣血傷虛羸之證作矣 薛前證產傷氣血者用八珍湯飲食傷胃者用四君子湯停食傷脾者用六君子湯勞傷元氣者用補中益氣湯若噯氣覺有藥味者此藥復傷胃也但用四君子湯徐徐少飲以調脾胃若胃氣一健血氣自生諸證自愈矣

丹產後補虛

人參

白朮

錢各一

黃芩

歸身尾

分各五

川芎

兩半陳

十全大補湯 治諸臟虧損氣血俱虛惡寒發熱或自汗盜汗便血吐血或大便不實飲食少思或胸腹作痛口舌生瘡或耳目不明牙齒不固

人參 白朮 白茯苓 黃芪 當歸 熟地黃

酒洗
蒸焙

白芍藥

炒

川芎

各一錢

肉桂

甘草

炙各五分

右十味薑棗水煎服

當歸建中湯

見前
腹痛

雲岐治產後虛損飲食不下四物加建中人參白朮茯

川芎

一兩

右十二味為粗末每服一兩水一盞半煎服日三

當歸羊肉湯 治產後雖無疾者但覺虛弱兼心腹痛

肥羊肉

一斤去脂水一斗
煮取八升去肉

當歸

五兩

黃芪

四兩

生薑

六兩

右以肉汁煮三味取二升五合分為四服若覺惡露
不盡加桂三兩惡露下多加芎三兩有寒加茱萸一
兩有氣加細辛二兩有熱加生地黃汁二合

保命治產婦虛勞不能食十全散

即十全
大補湯

薛前證若血氣虛弱用補中益氣湯脾氣虛弱用六君子湯命門火衰用八味丸肝脾血虛用加味逍遙散肝脾鬱怒用加味歸脾散

產寶療產後風虛羸瘦勞弱不生肌肉

黃芪 當歸 芍藥 人參 各三分 桂心 甘草

川芎 生薑 各四分 大棗 十二枚

右九味水七升煮三升分溫三服

療產後虛勞骨節疼痛頭汗不出

苓主之

療產後大虛心腹急痛血氣上搶心氣息乏補益方

黃芪

白朮

當歸

人參

甘草

各二兩

生薑

四兩

先以白羊肉三斤去膜水一斗九升煮肉取汁五升
下諸藥煮三升分三服

冷勞大夫產則血氣勞傷臟腑虛弱而風冷客之冷搏
於血氣血氣不能溫於肌膚使人虛乏疲頓致羸損不
平復若久不平復風冷入於子臟則胞臟冷使人無子

以口乾燥渴心下痞悶醫者不識認為胸膈壅滯以藥下之萬不得已但服見睨丸則愈 陳無擇評曰產後口乾痞悶未必只因食麪或產母內積憂煩外傷燥熱飲食甘肥使口乾痞悶當隨其所因調之可也心煩宜四物湯去地黃加入參烏梅煎若外傷燥熱看屬何經當隨經為治難以備舉飲食所傷見睨丸却能作効

薛前證若宿食停滯用六君枳實神麪若因肉食所致更加山查若因魚鱸之類再加陳皮其物既消而仍痞

當歸

人參

生薑

各二兩

黃芪

三兩

淡豉

三合

猪腎

二枚

粳米

三合

薤白

三合

右水一斗五升先煮猪腎取六升下諸藥煮取二升
分為三服

又方猪腎一雙煮入葱豉作臠如常食之

痞悶

郭問產後口乾痞悶者何答產後榮衛大虛血氣未定
食類太早胃不能消化類毒結聚於胃脘上熏胸中是

見覲丸

薑黃炒 三稜

醋炒

萆澄茄

陳皮

去白

良薑

人參

蓬莪茂

酒炒各等分

右七味為細末用蘿蔔搗爛絞取汁煮麵糊丸如梧子大每服三十丸蘿蔔湯下白湯亦可

腹脹

郭產後腹脹滿悶嘔吐不定者何答曰敗血散於脾胃脾受之則不能運化精微而成腹脹胃受之則不能受

或反作痛作嘔此脾胃受傷用六君子湯或噯酸噯腐
加炮薑作瀉更加升麻如不應佐以四神丸或間用補
中益氣湯 一婦人食角黍煩渴痞悶腹痛大便欲去
不去服消導之藥不應飲食日減肌體日瘦半年矣余
謂此食積為患用大酒麴炒為末溫酒調服二錢俄而
腹鳴良久仍下糞而愈 一婦人食魚酢腹痛患痢諸
藥不應用陳皮白朮等分為末以陳皮湯送下數劑而
愈

抵聖湯入生薑半兩焙乾水煎

方見胎前腹脹薛氏云此方最宜用之

局方平胃散加人參亦可

水腫

郭產後四肢浮腫者敗血垂虛停積循經流入四肢留
淫日深却還不得腐壞如水故令面黃四肢浮腫醫人
不識便作水氣治之凡治水多用導水藥極虛人產
後既虛又以藥虛之是謂重虛往往多致夭枉但服小
調經散血行腫消則愈 陳無擇曰產後虛浮多端有

納水穀而生吐逆醫者不識若以尋常治脹止吐藥治之病與藥不相干轉更傷動正氣疾愈難治但服抵聖湯則愈 薛前證若敗血傷於脾胃宜用前方若飲食停於脾宜用六君厚朴若飲食傷於胃宜用六君子湯大凡損其脾者當節其飲食為善 一產婦患前證或用抵當湯敗血已下前證益甚小腹重墜似欲去後余謂此脾氣虛而下陷用補中益氣湯加炮薑溫補脾氣重墜如失又用六君子湯而安

風寒在表面目四肢浮腫宜局方七聖丸白湯下日加
以利為度 如浮腫至膝喘嗽加木香枳榔倍之謂氣
多也 如浮腫又頭痛昏冒加羌活川芎謂風多也

如只浮腫止七聖丸本方服 東垣中滿分消丸

雜病
脹滿

用四物湯吞之 丹產後腫必用大補氣血為主少佐
以蒼朮茯苓使水自利 薛前證若寒水侮土宜養脾
肺若氣虛浮腫宜益脾胃若水氣浮腫宜補中氣當參
雜證本門主治 一產婦飲食少思服消導之劑四肢

自懷妊腫至產後不退者亦有產後失於將理外感寒暑風濕內則喜怒憂驚血與氣搏留滯經絡氣分血分不可不辨要當隨所因脈證治之宜得其情小調經散治血分固效但力淺難憑不若吳茱萸湯枳朮湯奪魂散大調經散皆要藥也 又論曰夫產後勞傷血氣膝理虛則為風邪所乘邪搏於氣不得宣越故令虛腫輕浮是邪搏於氣氣腫也若皮膚如熟李狀則變為水腫氣腫者發汗即愈水腫者利小便差也 潔古如產後

是也今愛寵小便不澀不作咳嗽惟手足寒乃血藏虛
氣塞不通流面生浮腫遂用益血和氣藥治之旬日病
去七八經半月全愈所用之藥乃靈苑方牡丹散也其
方云治血藏風虛冷今產科家多用此藥治產後諸病
如神更名損金湯者是也

牡丹散
見血暈

一婦產後四肢浮

腫寒熱往來蓋因敗血流入經絡滲入四肢氣喘咳嗽
胸膈不利口吐酸水兩脇疼痛遂用旋覆花湯微汗漸
解頻服小調經用澤蘭梗煎湯調下腫氣漸消

浮腫余謂中氣不足朝用補中益氣湯夕用六君子湯而愈後因怒腹脹誤服沉香化氣丸吐瀉不止飲食不進小便不利肚腹四肢浮腫用金匱加減腎氣丸而愈一產婦泄瀉四肢面目浮腫喘促惡寒余謂脾胃虛寒用六君加薑桂而泄瀉愈用補中益氣而脾胃健杜張宣徽侍寵產後半月忽患浮腫急召產科醫治經半月不差病勢轉劇召杜治之杜至曰諸醫作何病張曰皆云水氣浮腫杜曰非也且水氣發咳嗽小便澀

乾漆如此填滿用鹽泥固濟火煨通赤放冷研為散
但是產後諸疾熱酒調下二錢

經云產後肌浮柑皮酒服

橘皮為末每服二錢酒調

白朮湯 治心腹堅大如盤邊如旋盤水飲所作名曰
氣分

枳實

一兩半

白朮

三兩

右二味咬咀每服四錢水一盞半煎至七分去滓溫
服腹中臍即當散也

大調經散

治產後腫滿喘急煩渴小便不利

方見產後寒熱

小調經散

沒藥

琥珀

桂心

芍藥

當歸

各一錢

細辛

麝香

各半錢

右七味為細末每服半錢薑汁溫酒各少許調停服

治產後遍身青腫疼痛及產後血水疾

出婦人經驗方

乾漆

大麥蘗

等分

右二味各為細末以新瓦罐子中鋪一重麥蘗一重

右三味以生薑汁搜麩裹半夏為七餅子煨焦熟為末水調一盞小便利為効

張氏方治產後血虛風腫水腫

澤蘭葉

防已

等分

右二味為末每服二錢溫酒調下不飲者醋湯調亦可

漢防已散

此藥虛人戒服

漢防已

豬苓

枳殼

桑白皮

各一兩

商陸

甘

丹婦人產後浮腫小便少口渴惡寒無力脈皆沉此體
虛而有濕熱之積必上焦滿悶宜補中導水行氣可
也

白朮

二兩半

陳皮

一兩

川芎

半兩

木通

六錢

茯苓

三錢

右五味用水煎下與點丸二十五粒

黃芩為末粥丸名與點丸亦名

清金丸

奪魂散

治產後虛腫喘促利小便則愈

生薑

三兩取汁

白麩

三兩

大半夏

七枚

吳茱萸

一兩半

苦梗

乾薑

甘草

麥門冬

防

風

半夏

細辛

當歸

赤茯苓

牡丹皮

桂心

各半兩

右十二味為粗末每服四錢水一盞半煎至七分去

滓食前熱服

金匱加減腎氣丸

方見雜病水腫

加味八物湯

治產後遍身浮腫氣急潮熱

人參

白茯苓

熟地黃

小懷香

各三錢

白朮

草

各七錢半

右六味為粗末每服四錢水一盞半薑三片煎至七分去滓空心溫服

七聖丸

雜病大便不通

加減吳茱萸湯

治婦人臟氣本虛宿挾風冷胸膈滿

痛腹脇絞刺嘔吐惡心飲食減少身面虛浮惡寒戰慄或泄瀉不止少氣羸困及因生產藏氣暴虛邪冷內勝宿疾轉增

大夫積者陰氣也五臟所生聚者陽氣也六腑所成皆由飲食不節寒熱不調致五臟之氣積六腑之氣聚積者痛不離其部聚者其痛無有常處所以然者積為陰氣陰性沉伏故痛不離其部聚為陽氣陽性浮動故痛無常處產後血氣傷於臟腑臟腑虛弱為風冷所乘搏于臟腑與血氣相結故成積聚癥塊也 薛前證乃真氣虧損邪氣乘之况產後得之尤當固真氣為主若求旦夕之効而攻其邪則速其危矣當參前雜證積聚諸

川芎

錢各四

當歸

白芍藥

香附子

錢各五

甘草

黃芩

柴胡

錢各一

右十二味剉散分作六七服水一鍾半薑三片煎至

七分空心熱服盡此藥方服調經丸 若肚痛加延

胡索乾漆枳殼

錢各三

若嘔吐惡心加良薑砂仁

各二

錢

若手足麻痺加肉桂

半錢

若咳嗽加五味子

款冬花杏仁

積聚

血瘕即兒
枕宜參看

自舒遂用八珍湯逍遙散歸脾湯加減調治而愈一
婦月經不調兩拘腫脹小便澁滯腹中一塊作痛或上
攻脇腹或下攻小腹發熱晡熱惡寒肌膚消瘦飲食無
味殊類瘵證久而不愈余謂肝脾血氣虧損用八珍湯
逍遙散歸脾湯隨證五服而愈

大新產後有血與氣相搏而痛者謂之瘕瘕之言假也
謂其痛浮假無定處也此由風有風冷血氣不治至產
血下則少故致此病也不急治則多成積結妨害月水

方論治之 一產婦腹中似有一塊或時作痛而轉動
按之不痛面色痿黃痛則皎白脈浮而濇余謂此肝氣
虛而血弱也不信乃用破血行氣痛益甚轉動無常又
認以為血鼈專用破血驅逐之藥痛攻兩脇肚腹尤甚
益信為鼈確服下蟲等藥去血甚多形氣愈虛肢節間
各結小核隱於肉裏以為鼈子畏藥而走於外余曰肝
藏血而養諸筋此因肝血復損筋涸而攣結耳蓋肢節
胸項皆屬肝膽部分養其脾土補金水以滋肝血則筋

略渴發熱此胃氣為草藥所敗加以受傷之血妄行而不得洩所以為病也

砂仁

甘草

炙

川芎

黃芩

各三分

滑石

一錢半

牛膝

二 桃仁 七粒

右七味水酒煎服

芍藥湯

保命

治產後諸積不可攻宜養陰去熱其病自安

芍藥

一斤 黃芩

茯苓

各六兩

右三味剉散每以半兩水煎溫服日三

輕則否澁重則不通也 薛前證乃寒邪乘客氣血壅
結此因氣病而血病也當補養胃氣調和月經寬緩靜
養為善難經云任脈之病男子為七疝女子為瘕聚當
參前後各論治之

丹南山婦人年三十八於九月二十三日月經行比前
過後十日得草藥以敗血海為下胎之謀有數滴血下
因此腹痛在小腹下有塊如碗大不可按湯熨則痛稍
定大小便抽痛小便澁大便略下少赤積垢食不進口

當歸

二兩 桂心

芍藥

炒 血竭

蒲黃

炒各一兩半

延胡

索

炒一兩

右六味為末每服二錢空心熱酒調下

葛氏方

治證同前

桂心為末每服一錢空心酒調下

產寶療血瘕痛無定處

童便

升三 生地黃汁

生藕汁

各一升

生薑汁

升三

右先煎前三味約三分減二次下薑汁慢火煎如稀

飭每服取一合暖酒調下

丹產後消血塊

滑石

三錢

沒藥

血竭

各二錢

右三味為細末醋糊丸如惡露不下以五靈脂為細末麵糊丸白朮湯陳皮湯任下

又方消血塊

香附

童便浸

桃仁

去皮留尖等分

右二味為末醋糊丸

治血瘀作痛臍下脹滿或月經不行發熱體倦

桂心 當歸 赤芍藥 牡丹皮 沒藥 檳榔

各半 青皮 乾漆 炒烟盡各 大黃 桃仁 去皮三

兩 稜 煨 玄胡索 鼈甲 炙 厚朴 製各

一兩

右十四味為細末煉蜜和丸梧子大每服三四丸食
前用溫酒送下

霍亂

大產後霍亂氣血俱傷臟腑虛損或飲食不消觸冒風
冷所致陰陽不順清濁相干氣亂于腸胃之間真邪相

千金療血瘕

生乾地黄

一兩

烏賊魚骨

二兩

右二味為細末空心溫酒調服二錢匕

四神散 治產後瘀血不消積聚作塊心腹切痛

川芎

當歸

去蘆

乾薑

炮

赤芍藥

各等分

右四味為細末每服二錢食遠用溫酒調服

桂心丸 治產後血氣不散積聚成塊上攻心腹或成

寒熱四肢羸瘦煩疼

氣虛寒先用六君加炮薑為主佐以越鞠丸而嘔酸愈
又用補中益氣加茯苓半夏而脾胃康

白朮散 治產後霍亂吐痢腹痛煩渴手足逆冷

白朮 橘紅 麥門冬去心 乾薑 人參各一兩 甘草

半兩

右六味為粗末每服四錢水一盞生薑五片煎去滓

溫服

溫中散 治產後霍亂吐瀉不止

搏冷熱不調上吐下痢故曰霍亂也經曰渴而飲水者
五苓散寒多不飲水者理中九大段虛冷者加附子來
復丹亦妙 薛一產婦停食霍亂用藿香正氣散之類
已愈後胸腹膨脹飲食稍過即嘔吐或作瀉余謂此脾
胃俱虛用六君子湯加木香治之漸愈後因飲食失調
兼患怒患霍亂胸腹大痛手足逆冷用附子散又用八
味九以補土母而康設泥痛無補法而用辛散或用平
補之劑必致不起 一產婦吐瀉嘔酸面目浮腫此脾

良薑 當歸 草豆蔻仁

石三味等分為細末每服二錢用粥飲調下

右二方非真寒不可用

局方參苓白朮散 療產後霍亂吐利身熱帶渴者良

方見雜
病泄瀉

若吐逆不受湯藥以伏龍肝細末三錢米湯調下即受
餘詳雜病霍亂門

嘔吐

人參 白朮 當歸 草豆蔻仁 乾薑

各一兩

厚

朴

各兩半製

右六味為粗末每服三錢水煎服

附子散 療產後霍亂不止手足逆冷

附子

炮

白朮

當歸

吳茱萸

洗

桂心

人參

丁香

橘紅

甘草

各半兩

右九味為細末每服二錢粥飲調下不拘時

高良薑散 治產後霍亂吐利腹中疴痛

陽氣虛寒急用附子理中湯多有生者 一產婦朝吐
痰夜發熱晝夜無寐或用清痰降火肌體日瘦飲食日
少前證愈甚余曰早間吐痰脾氣虛也夜間發熱肝血
虛也晝夜無寐脾血耗也遂用六君子湯加味逍遙散
加味歸脾湯以次調理而痊

開胃散 治產後胃氣不和嘔吐不止全不納食宜服
此

訶子肉

半 一兩

人參

兩 一兩

甘草

兩 半

大夫妻胃為水穀之海水穀之精以為血氣榮潤臟腑因產則臟腑傷動有時而氣獨盛者則氣乘腸胃腸胃燥溢其氣則逆故嘔逆不下食也 薛前證若因飲食過

時用四君子湯飲食過多用六君子湯飲食過時而兼勞役用補中益氣若因飲食停滯用人參養胃湯脾胃氣虛用六君子湯胃氣虛寒加炮薑木香寒水侮土用益黃散肝木侮脾土用六君加升麻柴胡命門火衰不能生土用八味丸嘔吐泄瀉手足俱冷或肚腹作痛乃

右二味細切酒水各二升煎取一升分三服

產後嘔逆不已四君子湯加陳皮半夏藿香砂仁

石蓮散 治產後咳逆嘔吐心忪目暈

石蓮子

去殼一兩半

白茯苓

一兩五錢

丁香

右三味為細末米飲調服三錢無時

內熱嘔吐服前藥不効者以枇杷葉

去毛蜜炙

茅根各五錢

煎濃湯入蘆根汁半盞和勻服

吃逆

右三味為細末別以半夏半分生薑一分薤白二七莖水一大盞煎至六分去滓分為兩服

療產後嘔逆不止

鄧知縣傳

橘紅

一兩

半夏麴

甘草

各半兩

藿香

三兩

右四味為細末每服二錢水一盞半薑三片煎至六分溫服無時

治產後更無他疾但多嘔逆不能食

白朮

一兩二錢半

生薑

一兩半

參附湯

見前
自汗

丁香散

治產後心煩咳噫不止

丁香

白豆蔻仁

各半兩

伏龍肝

一兩

右三味為細末煎桃仁吳茱萸湯調下一錢如人行

五里再服

石蓮散

見嘔
吐

產寶療產後吃逆三日不止欲死方

桂心

半兩

薑汁

三合

大夫肺主氣五臟六腑俱稟於氣產後則氣血傷臟腑
皆損而風冷搏於氣氣於逆上而又脾虛聚冷胃中伏
寒因食熱物冷熱氣相衝擊使氣厥而不順則吃逆也
脾者主中焦為三焦之關五臟之倉廩貯積水穀若陰
陽氣虛使榮衛氣厥逆則致生斯病也經云吃噎者胃
寒所生服藥無効者灸期門三壯必愈期門穴乃胃之
大絡 薛前證屬胃氣虛寒之惡候如用後方未應急
投參附湯亦有復生者

服一服止

補遺治產後吃逆橘皮湯及大小橘皮湯皆効 右諸
方當審寒熱虛實用之如寒者宜丁香薑桂熱者宜
乾柿竹茹實者宜香附橘皮虛者宜人參甚則附子
佐之誤施則有噬臍之悔慎之

咳嗽

大夫肺者主氣因產後血虛肺經一感微邪便成咳嗽
或風或熱或寒或濕皆令人咳嗽也若產後喫鹽太早

右二味同煎取二合以大火炙手摩背熱時塗藥汁
盡妙

治產後吃逆方 用乾柿一枚切碎以水一盞煎至六
分熱呷之

又方 古壁鏡窠三四個水一小盞煎至半小盞熱服
羌活散 靈苑 治吃逆

羌活 附子 炮 藁香 炒各半兩 木香 白薑 炮各二錢半

右五味為末每服二錢水一盞鹽一捻煎十數沸熱

發喘急用二味參蘇飲多有得生者若兼口鼻起黑或鼻出血急用前飲亦有得生者然而所患悉因胃氣不足蓋胃為五臟之根本人身之根蒂胃氣一虛五臟失所百病生焉但患者多謂腠理不密所致殊不知肺屬辛金生於巳土亦因土虛不能生金而腠理不密外邪所感其陰火上炎亦壯土金生腎水以制火為善若遲治其病則誤矣 一產婦咳嗽聲重鼻塞流涕此風疾所感用參蘇飲一鍾頓愈六七乃與補中益氣加桔梗

而咳嗽者難治 產後血氣不通咳嗽者何答曰產後咳嗽多因食熱麵壅納或熱病或有氣塊發時衝心痛氣急咳嗽四肢寒熱心悶口乾或時煩躁睡夢驚悸氣虛肢體無力宜服局方黑神散五積散加棗煎服 薛產後咳嗽或因陰血耗損或因肺氣虧傷或陰火上炎或風寒所感主治之法若陰血虛者用芎歸熟地參朮肺氣傷者用四君芎歸桔梗陰火上炎者六味地黃加參朮風寒所感者補中益氣加桔梗紫蘇若瘀血入肺

知母 貝母

白茯苓

人參

各二錢

桃仁

杏仁

並生去皮
尖各一錢

右六味作一服水二鍾煎至一鍾食後服

集驗療產後感風傷寒咳嗽多痰唾粘

甘草

苦梗

各一兩半

款冬花

一兩

生麥門冬

生地黃

各三兩

蔥白

一握

舊方無蔥白與豉

合

右七味吹咀水二升煮取八合去滓食後分兩服

經効療咳嗽多痰唾粘氣急

茯苓半夏一劑而痊又與六君加黃芪以實其腠理而
安一產婦咳嗽痰盛面赤口乾內熱晡熱徹作無時
此陰火上炎當補脾腎遂用補中益氣湯六味地黃丸
而愈一產婦咳而腹滿不食涕唾面腫氣逆此病在
胃關於肺用異功散而愈

旋復湯

即旋復花湯見喘
有汗者去麻黃

知母飲 治產後惡露上攻流入於肺經咳嗽宜服此

藥若傷風痰嗽却以尋常傷風藥主治

一名二
母散

喘

婁產後喘極危多死也 郭產後喉中氣急喘促者何

答曰榮者血也衛者氣也榮行脈中衛行脈外相隨上

下謂之榮衛因產所下過多榮血暴竭衛氣無主獨聚

肺中故令喘也此名孤陽絕陰為難治若惡露不快敗

血停凝上熏於肺亦令喘急但服奪命丹

胞衣不下

血去喘

自定 陳無擇評曰產後喘急固可畏若是敗血上熏

於肺猶可責効奪命丹若感風寒或因憂怒飲食鹹冷

前胡 五味子 紫苑 貝母 各一兩半 桑白皮 茯苓

苓

各二兩

淡竹葉

二十片

右七味吹咀水二升煎取八合去滓食後分兩服

療產後咳嗽氣喘

百部根

苦梗

各六分

桑白皮

二十分

乾百合

赤茯苓

苓

各八分

右五味吹咀水二升煮取七合去滓食後分兩服

自製噲化丸

見前雜病咳嗽

七月初旬產後二月洗浴即氣喘但坐不得卧者五箇月惡風得暖稍寬兩關脈動尺寸皆虛百藥不効用牡丹皮桃仁桂枝茯苓乾薑枳殼厚朴桑白皮紫蘇五味瓜蒌仁煎湯服之即寬二三服卧其疾如失蓋作汚血感寒治之也

血竭散 治產後敗血衝心胸滿上喘命在須臾宜服

真血竭

如無紫
礦代

沒藥

右二味等分研細頻篩再研取盡為度每服二錢用

等奪命丹未可均濟况孤陽絕陰乎若榮血暴絕宜大料煮芎藭湯亦可救傷風寒宜旋覆花湯性理鬱發宜小調經散用桑白皮杏仁煎湯調下傷食宜服見睪丸五積散芎藭湯 薛前證若脾肺氣虛弱用六君桔梗若兼外邪更加紫蘇若中氣虛寒用補中益氣加炮薑肉桂若陽氣虛脫更加附子若瘀血入肺急用二味參蘇飲 一產婦喘促自汗手足俱冷常以手護臍腹此陽氣虛脫用參附湯四劑而愈 浦江吳輝妻孕時足腫

寧

旋覆花 赤芍藥 荆芥穗 半夏麴 前胡

甘草炙 茯苓 五味子 杏仁去皮尖
麩炒 麻黃各等

分

一方芍藥茯苓多一倍

右十味吹咀每服四錢水一盞半生薑三片棗一枚

煎至七分去滓食前溫服

有汗者
不宜服

若傷風冷飲食而喘者宜見覲丸

見前
痞悶

五味子湯 治產後喘促脈伏而厥

童便合好酒半大盞煎一沸溫調下方產下一服上
床良久再服其惡血自循經下行更不衝上免生百
病

雲岐參蘇飲 治產後血入於肺面黑發喘欲死者

人參

一兩
為末

蘇木

二兩

右二味以水兩碗煮取蘇木一碗以下去渣調參末
隨時加減服神効

旋覆花湯 治產後傷風寒喘咳嗽痰涎壅盛坐卧不

另磨入服 有瀉加訶子肉豆蔻栗殼

鼻衄

郭產後口鼻黑氣起及鼻衄者何答曰陽明者經脈之
海起於鼻交頰中還出頰口交人中左之右右之左產
後氣虛血散榮衛不理散亂入於諸經却還不得故令
口鼻黑氣起及變鼻衄此緣產後虛熱變生此證胃絕
肺敗不可治 經驗方云急取緋線一條并產婦頂心
髮兩條緊繫中指節上即止無藥可治亦禳厭之一端

五味子

料

炒人參

杏仁

各二錢

麥門冬

去心

陳皮

各一錢

右五味薑三片棗二枚水煎服

大補湯 治產後百日外面青浮腫唇白氣急有汗乃

大虛之證急宜服此

當歸頭

大川芎

大白朮

白芍藥

白茯苓

人參

多

黃芪

多

五味子

熟地黄

乾薑

上

甘草

少

右十一味剉散水煎服此二貼不退即加川烏木香

弱亦變崩中若小腹滿痛肝經已壞為難治急服固經丸以止之 陳無擇評曰血崩不是輕病况產後有此是謂重傷恐不止鹹酸不節而能致之多因驚憂恚怒臟氣不平或產後服斷血藥早致惡血不消鬱滿作堅亦成崩中固經丸自難責効不若大料煮芎藭湯加芍藥候定續次隨證諸藥治之為得 薛前證若血滯小腹脹滿用失笑散血少小腹虛痞芎藭湯肝火血妄行加味逍遙散脾鬱不統血加味歸脾湯脾氣虛不攝血

也 薛按胃脈俠口繞承漿蓋鼻準屬脾土鼻孔屬肺
金誠胃虛肺損氣脫血死之證急用二味參蘇飲加附
子五錢亦有得生者 汪一婦產後血逆上行鼻衄口
乾心躁舌黑蓋因瘀血上升遂用益母九二九童便化
下鼻衄漸止下血漸通

血崩

陳產後血崩者何答曰產卧傷耗經脈未得平復勞役
損動致血暴崩淋瀝不止或因酸鹹不節傷蠹榮衛衰

艾葉

赤石脂

煨

補骨脂

炒

木賊

各半

附子

一枚

炮

右五味為末陳米飯和丸如梧子大每服二十九食

前溫酒下米飲亦可

芎藭湯加芎藥方

芎藭

當歸

芍藥

各等分

右三味㕮咀每服四錢水一盞半煎至七分去滓熱

服無時

熟乾地黄散

治產後崩中頭目旋運神思昏迷四肢

補中益氣湯厚味積熱傷血清胃散加槐花風熱相搏
傷血四君子防風枳殼 一產婦血崩小腹脹痛用破
氣行血之劑其崩如湧四肢不收惡寒嘔吐大便頻瀉
余用六君加炮黑乾薑四劑稍愈又以十全大補三十
餘劑而痊 一產婦血崩因怒其血如湧仆地口噤目
斜手足抽搐此肝經血耗生風余用六味丸料一劑諸
證悉退但食少晡熱佐以四君柴胡牡丹皮而愈

固經丸

者 烏賊魚骨 鹿角膠 龍骨

各一兩

右九味為末每服二錢食前溫酒下

又方

赤石脂 熟地黄

各一兩

鹿茸 牡蠣

當歸

各半兩

右五味為細末食前以粥飲調下二錢

阿膠丸 治產後崩中下血不止虛羸無力

阿膠

赤石脂

各一兩

續斷

川芎

當歸

甘草

丹參

各一兩

龍骨

鹿茸

酥炙

烏賊魚骨

鼈甲

炙各

煩亂不知人事

熟乾地黄 伏龍肝 黃芪 赤石脂 阿膠

各一兩

甘草 白朮 艾葉 川芎 人參 當歸

各半兩

七錢半

右十一味 㕮咀 每服四錢水一盞半 薑三片煎至七分去滓溫服

白芍藥散 治產後崩中下血淋瀝不絕黃瘦虛損

白芍藥 牡蠣 乾薑 熟乾地黄 桂心 黃

燒

川芎

各七錢半 檳榔 二枚

右七味為細末每服三錢煨薑酒調下如未止更進一服或非時血崩無藥可治但進三服即止

補遺治產後血崩

香附子

炒赤二兩 蓮蓬殼 五枚燒存性

右二味為末米飲調下二錢

產後血崩素有熱者奇効四物湯良

方見血崩

月水不調

二兩共
為細末

右十一味煉蜜丸如梧桐子大空心溫酒下二三十

丸

菖蒲酒 治產後崩中下血不止

菖蒲

一兩半
細剉

以酒二盞煮取一盞去滓分溫三服

食前

瑞蓮散 治產後惡血崩漏狀如泉水

瑞蓮

百枚燒
存性

棕櫚

燒存
性

當歸

桂心

各一
兩

鯉魚鱗

月經不調內熱燥渴服寒涼之劑血更如崩腹脹寒熱作嘔少食用六君子二十餘劑諸病悉愈以加味逍遙散調理而安

琥珀散 治產後經脈不調四肢煩疼飲食全少日漸羸瘦

琥珀 牛膝 生乾地黄 當歸 桃仁 赤

芍藥

各半兩

右六味為粗末每服三錢水一盞薑三片煎至六分

大產後月水不調者由產傷動血氣虛損未復而風邪
冷熱之氣客於經絡乍冷乍熱冷則血結熱則血消故
令血或多或少或在月前或在月後故名不調也 薛
前證若過期而作痛者氣血俱虛也八珍加柴胡丹皮
不及期而來血熱也四物山梔柴胡將來而作痛者血
實也四物加桃仁紅花過期而來者血虛也四物加參
朮紫黑成塊者血熱也四物加炒梔炒連丹皮作痛而
色淡者瘀多也四物合二陳治當臨證制宜 一產婦

月水不通

大夫產傷動於血氣其後虛損未復而為風冷所傷血之為性得冷則凝結故風冷傷於經血結於胞絡之間故令月水不通也凡血結月水不通則成血瘕水血相併復遇脾胃衰弱肌肉虛者則為水腫也 婦人衝任之脈為經絡之海皆起於胞內而手太陽小腸之經手少陰心之經此二經上為乳汁下為月水若產後月水不通者蓋新產之後勞傷氣血或去血過多乳汁通行

去滓服

薑黃丸

治產後虛乏不足胸心短氣腹內緊急腰背

疼痛月水不調食少煩渴四肢無力

薑黃 當歸 熟地黃 牡丹皮 厚朴 製桂心

川芎 續斷 桃仁 白朮 赤芍藥 木

香 各七錢半 羚羊角屑 二錢半

右十三味為細末煉蜜丸如梧子大每服三十丸食

前溫酒下

等藥以通之則為害滋大經水枯竭則無以滋養其能
行乎初虞世所謂譬猶索萬金於乞丐之手雖捶楚並
下而不可得也後之學者更宜詳審而療之 薛前證

脾胃虛弱用六君子湯若兼鬱火傷脾用歸脾湯加丹
皮山梔若怒火傷血宜用四物合小柴胡氣血俱虛用
八珍牡丹皮仍參前論主之 一產婦月經年餘不通
內熱晡熱服分氣丸經行不止惡寒作渴食少倦怠胸
滿氣壅朝用加味逍遙散夕用四君子湯月許諸證稍

自是不通若乳子歲半或一歲之內而月經不行此是
常候即非病也何必通之諺云妳假是也若半歲而行者
或四五箇月便經行者皆是少壯血盛之人注受極易
產乳必衆其子失乳必四肢尪羸肚大青筋頭大髮焦
好啖泥土病名無辜若經血有餘者不可以藥止之若
產後一二歲月經不通而無疾苦何必服藥或勞傷氣
血衝任脈虛氣血衰少而不能行者但服健脾胃資氣
血之藥自然通行若用牛膝紅花蘇木乾漆蝨蟲水蛭

評曰產後下痢非止一證當隨所因而調之既云飲冷當風何所不至寒熱風濕本屬外因喜怒憂思還從內性况勞逸飢飽皆能致病若其洞泄可服調中湯赤白滯下非此能愈各隨門類別有正方 薛產後瀉痢或因飲食傷損脾土或脾土虛不能消食當審而治之若米食所傷用六君加穀蘖若麵食所傷用六君加麥蘖若肉食所傷用六君加山查神麴凡兼嘔吐皆加藿香若兼噯酸或嘔吐用前藥送越鞠丸若肝木來侮脾土用

愈佐以八珍湯兼服兩月而愈 以上三證宜於調經
門中參看通用

瀉利

郭產後腹痛及瀉利者何答曰產後腸胃虛怯寒邪易
侵若未滿月飲冷當風乘虛襲留於育膜散於腹脇故
腹痛作陣或如錐刀所刺流入大腸水穀不化洞泄腸
鳴或下赤白眩脇填脹或痛走不定急服調中湯立愈
若醫者以為積滯取之禍不旋踵謹之謹之 陳無擇

於任而繫於腎況九月十月乃腎與膀胱所養必用四神六味八味三藥以補腎若用分利導水之劑是虛其虛也 一產婦瀉痢發熱作渴吐痰甚多肌體消瘦飲食少思或胸膈痞滿或小腹脹墜年餘矣余以為脾胃瀉朝用二神九夕用六君子三月餘而痊 一婦產後泄瀉兼嘔吐噦酸面目浮腫此脾氣虛寒先用六君加炮薑為主佐以越鞠丸而噦酸愈又用補中益氣加茯苓半夏而脾胃康 一產婦瀉利年餘形體骨立內熱

六君加柴胡炮薑若寒水反來侮土用錢氏益黃散若
久瀉或元氣下陷兼補中益氣湯以升發陽氣若瀉痢
色黃乃脾土真氣宜加木香肉果若脾土虛寒當用六
君子加木香薑桂若脾腎虛寒用補中益氣及四神丸
若屬命門火衰而脾土虛寒用八味丸以補土母若小
便滯滯肢體漸腫或兼喘咳用金匱腎氣丸以補脾腎
利水道若胃氣虛弱而四肢浮腫治須補胃為主若久
而不愈或非飲食所傷而致乃屬腎氣虧損蓋胞胎主

四服全愈至七月終怠惰嗜卧四肢不收體重節痛口
舌乾燥飲食無味大便不實小便頻數洒淅惡寒悽慘
不樂此肺之脾胃俱虛而陽氣寒不伸也用升麻益胃
湯而痊 汪石山治一婦產後滑泄勺水粒米弗容時
即泄下如此半月餘衆皆危之或用五苓散平胃散病
益甚汪診之脈皆濡緩而弱曰此產中勞力以傷其胃
也若用湯藥愈滋胃濕非所宜也令以參苓白朮散除
砂仁加陳皮肉豆蔻煎薑棗湯煎服旬餘而安

補熱自汗盜汗口舌糜爛日吐痰三碗許服脈洪大重按全
無此命門火衰脾土虛寒而假熱吐痰者乃脾虛不能
統攝歸源也用八味丸補火以生土用補中益氣湯兼
補肺金而脾胃健一產婦腹痛後重去利無度形體
倦怠飲食不進與死為鄰此脾腎俱虛用四神九十全
大補湯而愈但飲食難化肢體倦怠用補中益氣湯而
康一婦人五月患痢日夜無度小腹墜痛發熱惡寒
用六君子湯送香連丸二服漸愈仍以前湯送四神丸

調中湯

高良薑 當歸 桂心 芍藥 附子 炮 川芎 各

兩 甘草 半兩

右七味為粗末每服三錢匕水三盞煎至一盞去滓
熱服

右方惟寒中洞泄者宜之其腸胃有熱者當服黃連
而愈如金丸香連丸之類若戊己丸固腸丸四神
丸五味子丸之類皆產後大便不實必用之藥已詳

丹治產後泄瀉惡露不行此餘血滲入大腸為瀉洞泄
不禁下青白黑色用荊芥大者四五穗於盞內燒灰不
得犯油火入麝香研湯三呷調下此藥雖微能治大病
方名的
奇散

產後泄方

茯苓 川芎 黃芩 白朮 乾薑 滑石 陳

皮 芍藥

炒各
等分

右八味水煎服之

痢青色則極冷也若飲食不進便利無常日夜無度產後本虛更加久痢不止無力瘦乏愈見羸弱謂之虛羸下痢又有產後氣宇不順而下痢赤白謂之氣痢治之之法熱則涼之冷則溫之冷熱相搏則調之滑者澀之虛羸者補之水穀不分者當利小便若產婦性情執著不能寬解須當順其氣未有不安者也 薛前證白屬

氣分而赤屬血分也其論詳見瀉利 一產婦食雞子腹中作痛面色青黃服平胃二陳更下痢腹脹用流氣

載雜病及前泄瀉門中茲不贅引

赤白痢

大產後痢疾者由產勞傷臟腑不足日月未滿虛乏未復或勞動太早或誤食生冷若行起太早則外傷風冷乘虛入於腸胃若誤食生冷難化之物傷於脾胃皆令洞泄水瀉甚者變為痢也若血滲入大腸則為血痢難治世謂之產子痢也得冷則白或如魚腦得熱則赤黃或為驟血若冷熱相搏則下痢赤白或濃血相雜若下

各三
兩

右六味咬咀水煎分二服空心飲

大當歸芍藥散 治妊娠腹中絞痛心下急痛及療產

後血暈崩中久痢

方見
血崩

療妊娠血痢用阿膠二兩以酒一升半煮一升頓服

產後諸痢煮薤白食之 又方羊腎脂炒薤白空心食

之甚佳

經治產後胎前痢疾敗龜甲一枚米醋炙研為末醋湯

飲子又小腹一塊不時上攻飲食愈少此脾胃虛寒肝木尅侮所致用補中益氣加木香吳茱萸漸愈又用八珍大補兼服調理尋愈 一婦產後痢未至月滿因食冷物及酒冷熱與血攻擊滯下純血纏墜極痛其脈大無力口乾用黃芩芍藥湯三服而安

熊治產後赤白痢證用四君子湯加黃耆粟殼神効
雲救急散 治產後赤白痢腹中絞痛

芍藥 阿膠 艾葉 熟地黄 甘草 當歸

各一兩

黃連

兩四

阿膠

蒲黃

梔子仁

兩各一

當歸

兩二

黃

芩

黃蘗

兩各二

右七味為末煉蜜丸如桐子大每服六七十丸米飲

吞下日三夜一

仲產後下痢虛極白頭翁加甘草阿膠湯主之

脈經作熱痢重

下新產
虛極者

白頭翁

阿膠

兩各二

黃連

黃蘗

秦皮

兩各三

甘

草

兩二

調下

丹溪云龜甲大補陰治勞倦

丹婦人患墮胎後膈滿食少痢不止脈虛左手尤甚

滑石

白芍藥

炒

蒼朮

各五錢

白朮

二錢五分

訶子

二錢煨

乾薑

四錢

茯苓

一錢

右七味為細末調下保和丸四五十粒

雲產後血痢臍腹疼痛四物湯加槐花黃連御米殼等

藥

黃連丸 治產後赤白痢腹中攪痛不可忍

大療產後痢日五十行者取木裏蛀蟲糞屑炒黃急以
水沃之令稠稀得所服之即瘥

聖治產後諸痢方取蒼耳葉搗汁半盞日三四溫服

渴產後下痢作渴者水穀之精化為血氣津液以養臟
腑臟腑虛燥故痢而渴若引飲則難止反溢水氣脾胃
既虛不能尅水水自流溢浸漬皮膚則令人腫但止其
渴痢則自瘥 薛前證若渴而不喜冷飲屬胃氣虛不
能生津液宜用七味白朮散夜間發熱口渴屬腎水弱

右六味以水七升煮取二升半納膠令消盡溫分三服

婦人臨產痢疾山梔不拘多少燒灰為細末空心溫熟水調下一錢甚者不過五服

產後血痢小便不通臍腹疼痛用生馬齒莧搗汁二大合煎一沸下蜜一合調頓服

梅治產後血泄不禁餘血作痛兼塊桂心乾薑等分為末空心酒調服方寸匕

經効療產後久痢津液涸渴不止

龍骨

一錢二分

厚朴

茯苓

黃芪

麥門冬

人參

各八分

生薑

六分大棗

十四箇並細剉

右八味以水一大升煮取七合空心分兩服

療產後痢日久津液枯竭四肢浮腫口乾舌燥

古今錄驗

冬瓜一枚黃泥糊厚五寸煨爛熟去皮絞汁服之瘥

補遺人參白朮散治產後痢津液竭渴不止

方見胎前霍亂

大便秘澀

而不能潤宜用六味丸並佐以益氣湯以滋化源一
產婦瀉痢發熱作渴吐痰肌體消瘦飲食少思或胸膈
痞悶或小腹脹墜年餘矣余以為脾腎之瀉朝用二神
丸夕用六君子三月餘而痊一產婦患前證形體倦
怠飲食不進與死為隣此脾胃俱虛也用四神丸十全
大補湯而愈

必効療產後痢而渴飲無度數

麥門冬

三兩 烏梅 二十箇

細剉水一升煮取七合細呷

氣或愈加難通或通而瀉不能止必成敗證若屬血虛
火燥用加味逍遙散氣血俱虛八珍湯慎不可用麻子
杏仁枳殼之類 一產婦大便不通七日矣飲食如常
腹中如故余曰飲食所入雖倍常數腹不滿脹用八珍
加挑仁杏仁至二十一日腹滿欲去用豬膽汁潤之先
去乾糞五七塊後皆常糞而安 一產婦大便八日不
通用通利之藥中脘作痛飲食甚少或云通則不痛痛
則不通乃用蜜導之大便不禁吃逆不食余曰此脾腎

郭產後大便秘澀者何答曰產卧水血俱下腸胃虛竭
津液不足是以大便秘澀不通也若過五六日腹中悶
脹者此乃燥屎在臟腑以其乾澀未能出耳宜服麻仁
丸以津潤之若誤以為有熱投之寒藥則陽消陰長變
證百出性命危矣 薛產後大便不通因去血過多太
腸乾涸或血虛火燥乾涸不可計其日期飲食數多用
藥通之潤之必待腹滿覺脹自欲去而不能者乃結在
直腸宜用豬膽汁潤之若服苦參藥潤通之傷中焦元

九未通漸加丸數不可太過

評曰產後不得利者百無一生去血過多臟燥大

便秘澀則固當滑之大黃似難輕用唯蔥涎調臘茶

為丸復以臘茶下之必通

予常用局方四物湯以生地黃易熟地黃加青皮去

白煎服甚効

本事婦人產後有三種疾鬱冒則多汗汗多則大便秘

故難於用藥惟麻子蘇子粥最為穩當用紫蘇子大麻

子二味各半合洗淨研極細用水再研取汁一盞分二

復傷用六君加吳茱肉果骨脂五味數劑喜其年壯而愈不然多致不起 一產婦大便秘結小腹脹痛用大

黃等藥致吐瀉不食腹痛胸痞余用六君子加木香炮

薑治之而愈 一婦人大便秘澀諸藥不應苦不可言

令飲人乳而愈

麻仁丸

麻仁

研如泥

枳殼

人參

各一兩

大黃

半兩

右四味為末煉蜜丸如梧桐子大空心溫酒下二十

丹產後秘結不通膨滿者氣急坐卧俱難用大麥蘖炒

黃為末酒下一合神効

出兵部
手集

大小便不通

大產後大小便不通者腸胃本挾於熱因產血水俱下

津液燥竭腸胃痞澁熱氣結於腸胃故令大小便不通

也 薛嘗治一產婦大小便不通諸藥不應將危矣令

飲牛乳一日稍通三日而痊人乳尤善

桃花散 治膀胱氣滯血澁大小便秘

次煮粥啜下此粥不唯產後可服大抵老人諸虛風秘
皆宜服之嘗有一人母年八十四忽爾腹痛頭疼惡心
不食召醫數十議皆用補脾進食治風清利頭目等藥
數日雖愈全不入食其家憂惶余辨說前藥皆誤矣此
證正是老人風秘臟腑壅滯聚於胸中則腹脹惡心不
思飲食又上至於顛則頭痛神不清也若臟腑流暢諸
疾悉去矣予令作此粥兩啜而氣泄先下結糞如胡椒
者十餘枚後漸得通利不用藥而自愈矣

心治婦人產後忽小腹脹如蠱大小便不通氣海三里
關元三陰交陰谷主之

遺尿

薛產後遺尿若脾腎虛弱用還少丹仍以補中益氣湯
為主虛寒加肉豆蔻補骨脂或四神丸若脾腎虛寒用
八味丸兼四神丸仍佐以前二方

按產後遺尿乃腎氣不固宜五味子丸主之

雜病
泄瀉

一

產婦大便不實飲食少思或侵晨遺尿此中氣虛寒脾

桃仁 葵子 滑石 檳榔

各等分

右四味為細末每服二錢空心蔥白湯調下

療產後大小便不利下血

車前子 黃芩 蒲黃 牡蠣 生地黃 芍藥

各一兩
五錢

右六味為細末空心米飲服方寸匕忌麪蒜

通氣散 治產後大小便不通亦可用封臍法

見前雜證大便

不通

補遺療產後遺糞不知出時方

白飲

芍藥

各等分
為末

酒服方寸匕

補遺治產後遺糞不知覺可服固腸丸

方見前雜
症泄瀉條

華佗云病人卧遺尿不覺者死

淋閼

大產後諸淋因產有熱氣客於脬中內虛則起數熱則小便澀痛故謂之淋 又有因產損氣虛則挾熱熱則搏於血即流滲於胞中故血隨小便出而為血淋淋者

腎不足用補中益氣送四神丸而痊 一產婦小便出
糞名大小腸交乃氣血俱虛失行常道先用六君子湯
二劑又用五苓散二劑而痊尋常腸交亦可用

廣濟療產後遺尿方

取故燕窠中草燒為末以酒調下半盞亦治男子

集驗方 療產後遺糞亦治男子

礬石 枯 牡蠣

煨各
等分

右二味為末酒服方寸匕日三服

茅根湯 治產後諸淋無問冷熱膏石氣結悉主之

白茅根

八兩

瞿麥穗

白茯苓

各四兩

葵子

人參

各二

兩

蒲黃

桃膠

滑石

甘草

各一兩

紫貝

十枚

石

首魚頭中石

二十枚燒

右十一味剉散每服四大錢水一盞半薑三片燈心

二十莖煎至七分去滓溫服亦可為末木通煎湯調

下二錢如氣壅閉木通橘皮煎湯調下

滑石散

千金

療產後淋

淋瀝之謂也 三因論曰治諸產前後淋瀝其法不同
產前當安胎產後當去血如其冷熱膏石氣淋等為治
則一但量其虛實而用之瞿麥蒲黃最是產後要藥唯
當尋究其所因則不失機要矣 薛按前證若膀胱虛
熱用六味丸若陰虛而陽無以化用滋陰腎氣丸蓋土
生金金生水當滋化源也 一產婦小水淋瀝或時自
出用分利降火之劑二年不愈余以為肺腎之氣虛用
補中益氣湯六味地黃丸而痊

草三冬葵子二

兩合

右六味水二升煮取一升入魚齒末空心服

治產後小便不通腹脹如鼓悶亂不醒蓋緣未產之前
內積冷氣遂致產時尿胞運動不順用鹽於產臍中填
可與臍平却用蔥白剝去麤皮十餘根作一縛切作一
指厚安鹽上用大艾炷滿蔥餅子大小以火灸之覺熱
氣直入腹內即時便通神驗不可具述

出產
乳集

小便數

滑石

一兩二錢半研

通草

車前子

葵子

各一兩

右四味為末以漿水調服方寸匕至二匕為妙

張不愚療產後小便不通淋閉方

陳皮

一兩去白為末

空心溫酒調下二錢一服便通

療卒不得小便方

杏仁

十四枚去皮尖

右炒為末和飲頓服通

療產後淋小便痛及血淋

白茅根

五兩

瞿麥

車前子

各二兩

鯉魚齒

一百枚為末

通

痢後小便頻數手足俱冷屬陽氣虛寒用前湯及八味丸而瘳

桑螵蛸散

千金

治產後小便數及遺尿

桑螵蛸

三十枚煨

鹿茸

酥炙

黃芪

各三兩

牡蠣

煨

人參

厚

朴

赤石脂

各二兩

右七味為末空心粥飲調下二錢

外臺無厚朴石脂有甘草生薑

括婁湯

集驗

療產後小便數兼渴

桑螵蛸

甘草

並炙

黃連

生薑

各二兩

括婁根

三人

大夫產後小便數者乃氣虛不能制故也 薛前證若

因穩婆不慎以致胞損而小便淋瀝者用八珍湯以補氣血若因膀胱氣虛而小便頻數當補脾肺若膀胱陰虛而小便淋瀝須補肺腎 一產婦小便頻數時復寒

戰乃屬脾肺虛弱用補中益氣湯加山茱山藥為主佐以桑螵蛸散而愈後患發熱晡熱盜汗自汗月水不調用加味逍遙散而安 一產婦患前證吐痰發熱日晡作渴此膀胱陰虛用補中益氣湯以六味丸而愈又患

完胞雖在腹恐亦可治遂診其脈虛甚予曰難產之由多是氣虛產後血氣尤虛試與峻補因以參芪為君芎歸為臣桃仁陳皮黃芪茯苓為佐煎以豬羊胞中湯極饑時飲之但劑小率用一兩至一月而安蓋令氣血驟長其胞自完恐稍緩亦難成功矣

喬町婦人產後尿不禁面微浮略發熱于午後此膀胱為坐婆所傷

黃芪

歸身尾

芍藥

各一錢半

白朮

一錢

人參

陳皮

參三
兩大棗

五十
枝

右七味細切用水七升煮二升半分三服忌豬肉冷水

補遺療產後小便數或遺尿

益智仁

為末

米飲調服

小便不禁

陳婦人產蓐產理不順致傷膀胱遺尿無時

丹嘗見

收生者不謹損破產婦尿脬致病淋瀝遂成廢疾一日有徐婦年壯難產得此因思肌肉破傷在外者宜可補

廣濟療產後小便不禁 鷄尾毛燒存性酒調下一匕

日三服

千金治產後遺尿不知出

白薇

芍藥

各等分

為末酒服方寸匕日三

又方

桑螵蛸

半兩炒

龍骨

一兩

為末食前粥飲調下二錢

固脬散 治婦人臨產時傷手脬破小便不禁

黃絲絹

自然黃者染黃者不用三尺以炭灰汁煮極爛以清水洗去灰令淨入黃蠟半兩蜜

各五
甘草
灸少
分許

右七味水煎熱服之

薛前證若脾肺陽虛用補中益氣湯若肝腎陰虛用六味地黃丸若肝腎之氣虛寒用八味地黃丸一產婦小便不禁二年不愈面色或青赤或黃白此肝脾氣虛血熱用加味逍遙散為主漸愈佐以六味地黃丸而痊後因怒小便自遺大便不實左目頻緊面色頻赤仍用前散佐以六君子湯以清肝火生肝血培脾土而痊

小便出血

大產後小便出血者因血氣虛而熱乘之血得熱則流散滲於胞內故血隨小便出 薛一產婦尿血面黃脇脹少食此肝木乘脾土也用加味逍遙補中益氣兼服而愈後為懷抱不樂食少體倦驚悸無寐血仍作用加味歸脾湯二十餘劑將愈惑於衆論服犀角地黄湯諸證復作仍服前湯而愈

治小便利血方

亂髮

湯洗垢膩淨

右燒研為末米飲調

一兩白茅根二錢
馬屁勃末二錢

右用水二升再煮至一盞空

心頓服服時飲氣服之不得作聲如作聲無効

補遺補脬飲 治產後傷動脬破終日不小便但淋濕

不乾

生絲絹

黃色者
一尺

白牡丹根皮木

白芨

各一錢

用水一碗煎至絹爛如餬服之勿作聲作聲無効

雞內金散 治產後溺床失禁

以雞胗脰一具并腸洗燒為末酒調服方寸匕

陽絡外傷治法若因膏粱積熱用加味清胃散若因淳
酒濕毒葛花解醒湯若因怒動肝火六君加芍藥柴胡
芍歸若因鬱結傷脾加味歸脾湯若因思慮傷心妙香
散若因大腸風熱四物加側柏荆防枳殼槐花若因大
腸血熱四物加苓連若因腸胃虛弱六君加升麻柴胡
若因腸胃虛寒六君加肉蔻木香若因元氣下陷補中
益氣加茯苓半夏若因氣虛用六君升麻若因血虛用
四物氣血俱虛用八珍俱加柴胡升麻大凡病久或元

服方寸匕

又方 用滑石研髮灰分等每服一錢地黄汁調下

崔氏方 療產後血滲入大小腸 蜜一大合車前子搗汁

升一 右相和煎沸分兩服

補遺方 治產後小便出血 川牛膝去蘆 水煎服

又方 生地黃汁半升生薑自然汁半合 右相和服之

大便下血

薛產後便血或飲食起居或六淫之情以致元氣虧損

氣加味逍遙二藥而不復作 一婦人久下血在糞前
屬脾胃虛寒元氣下陷用補中益氣湯加連炒吳茱一
錢數劑稍緩乃加生吳茱五分数劑而愈 一婦人產
後便血口乾飲湯胸脇膨滿小腹悶墜內熱晡熱飲食
不甘體倦面黃日晡則赤洒漸惡寒此脾肺氣虛先用
六君加炮薑木香諸證漸愈用補中益氣將愈用歸脾
湯全愈後飲食失節勞役兼怒氣發熱血崩夜間熱甚
譫語不絕此熱入血室用加味小柴胡二劑而熱退用

氣虛弱見病百端皆因脾胃虧損內真寒而外假熱但
用六君子或補中益氣加炮薑溫補脾氣諸證悉退若
四肢畏冷屬陽氣虛寒急加附子病因多端當臨證制
宜庶無誤矣 一產婦糞後下血諸藥不應飲食少思
肢體倦怠此中氣虛弱用補中益氣加吳茱炒黃連五
分四劑頓止但怔忡少寐盜汗未止用歸脾湯治之而
痊 一婦人但怒便血寒熱口苦或胸脇脹痛或小腹
痞悶此木乘土用六君加山梔柴胡而愈又用補中益

桃仁膏

治產後陰腫妨悶

桃仁

去皮尖

枯礬

五倍子

各等分

右以下二味為末研桃仁為膏拌勻傅之

硫黃湯

治產勞玉門開而不閉

硫黃

四兩

吳茱萸

兔絲子

各一兩半

蛇床子

二兩

右四味每服四錢水一碗煎數沸濾滓洗玉門日再洗

熨法 單炒蛇床子乘熱布裏熨患處亦治產後陰痛

補中益氣而血止用逍遙散歸脾湯調理而康

陰脫產門不開

三因婦人趣產勞力努嚙太過致陰下脫若脫肛狀及陰下挺出逼迫腫痛舉重房勞皆能發作清水續續小便淋露

硫黃散 治產後勞傷陰脫

硫黃 烏賊魚骨

各半 兩 五味子 二錢半

右三味為末摻患處

與炙黃芪半錢人參一錢白朮五分當歸一錢半升麻五分三貼連服之即收上得汗通身乃安但下齋沾席處乾者落一片約五六兩重蓋脂膜也食進得眠診其脈皆濇左略弦視其形却實與白朮芍藥各錢半陳皮一錢生薑一片煎二三貼以養之一婦人產子後陰戶中下一物如合鉢狀有二岐其夫來求治予思之此子宮也必氣血弱而下墜遂用升麻當歸黃芪大料二貼與之半日後其夫復來曰服二次後覺響一聲視之

當歸散 治陰下脫

當歸

黃芩

各二兩

芍藥

一兩半

蠟皮

燒存性半兩

牡蠣

二兩

半兩

右五味為末每服二錢溫酒米湯任意調下忌登高
舉重

丹溪婦人三十餘歲生女二日後產戶一物如手帕
下有怕尖約重一斤予思之此因胎前勞乏傷氣成肝
痿所致却喜血不甚虛其時歲暮天寒恐冷乾壞了急

經虛熱也加味逍遙散若因憂怒肝脾氣血傷也加味
歸脾湯若因暴怒肝火血傷也龍膽瀉肝湯 一產婦
玉門不閉發熱惡寒用十全大補加五味子數劑而寒
熱退用補中益氣加五味子數劑而玉門閉 一婦人
脾胃素弱兼有肝火產後玉門腫痛寒熱作渴嘔吐不
食外敷大黃等藥內用驅利之劑腫及於臀諸證蜂起
此真氣虛而邪氣盛也先用六君子以固腸胃次用補
中益氣以升陽氣不數劑而全愈 一產婦患此失治

已收陰戶訖但因經宿乾著席上破一片如掌心大在
席某妻在家哭泣恐傷破不可復生予思之此非腸胃
乃糟粕也肌肉破尚可復完若氣血充盛必可生滿遂
用四物湯加入參與一百貼三年後復有子一治子宮
下用黃芪一錢半人參一錢當歸七分升麻三分甘草
二分作一貼水一鍾煎至五分去滓食前服却用五倍
子末泡湯洗又用末傅之如此數次宜多服藥永不下
薛玉門不閉氣血虛弱也用十全大補湯腫脹焮痛肝

投灰中適溫冷澄清坐水中以浸玉門斯須平復如故又方以鐵精粉上推內之又灸臍下橫紋五七壯

一法用鐵精羊脂二味攪令稠布裏炙熱熨推內之

鐵精

是煅鐵爐中飛出如塵紫色而輕虛可以瑩磨器皿者

子母療產後陰下脫

燒兔頭未傳之

補遺治產後生腸不收用枳殼煎湯浸良久即入

又方用五倍子白礬煎湯浸亦良

又方酸篤草俗名老鴟酸煎湯用草坐不開孔纔薰

腫潰不已形體消瘦飲食少思朝寒暮熱自汗盜汗半
年矣用補中益氣湯加茯苓半夏濃水漸少飲食漸進
又用歸脾湯共五十餘劑而愈 一產婦玉門不閉小
便淋瀝腹內一塊攻走脇下或脹或痛用加味逍遙散
加車前子而愈 一婦人子宮腫大二日方入損落一
片殊類豬肝面黃體倦飲食無味內熱晡熱自汗盜汗
用十全大補湯二十餘劑諸證悉愈仍復生育

治產後陰腫下脫內出玉門不閉 石灰一升炒湯二升

極熱

之則痛欲絕先服失笑散數次以帶皮薑三斤研爛入清油二斤煎油乾為度用絹兜起肉線屈曲于水道邊以前薑薰之冷則熨之一日夜縮其大半二日即盡入再服失笑散芎歸湯調理之如肉線斷則不可治矣

陰蝕

大凡婦人少陰脈數而滑者陰中必生瘡名曰蠱瘡或痛或痒如蟲行狀淋露膿汁陰蝕幾盡者此皆由心神煩鬱胃氣虛弱致氣血留滯故經云諸痛痒瘡皆屬於

收一半稍溫下手洗並收入而安

又方子宮脫出以溫水洗軟却用雄鼠糞燒烟薰入

又法革麻子十四粒去殼搗爛塗頂心如入即洗去

東婦人胞胎門落頰不收常濕 神關 玉泉

五十壯身

交

臍下指縫中灸五十壯三報

又法 玉泉傍門三寸

火隨年壯三報

女人

陰門冷腫

飯來

三十壯

甲婦人陰挺出四肢淫灤身悶少海主之

一作照海

陰中肉線一婦產後水道中出肉線一條長三四尺動

度

洗搨湯方

甘草

乾漆

各一兩

黃芩

乾地黄

當歸

芍藥

各二兩

龜甲

五兩

右七味細切以水七升煮耗一半以綿帛內湯中以搨瘡處良久即易日二度每搨湯可人行十里許即衰乾捻取甘濕散薄傳瘡上使遍可經半日又以湯搨搨訖如前傳藥 余家婢遇此疾醫療不差蝕處

心又云陽明主肌肉痛痒皆屬於心治之當補心養胃
外以薰洗坐導藥治之乃可 薛前證乃肝脾鬱結之
證木旺生蟲耳宜解鬱清肝備見前雜證陰中生瘡類
一產婦素有肝火患此內潰痒痛食少熱渴小水淋
瀝用加味逍遙散加味歸脾湯兼服間以蘆薈丸外以
鶴虱草煎洗而愈

千金方

蒲黃

三水銀

一兩

二味研勻以粉上

又方 肥豬肉十斤水一碩煮水浸冷即易不過三兩

訖然後取藥如棊子安竹管裏吹入下部中亦用再
度老少少量減其熏法每日一度不用再為之良

療疳蟲蝕下部及五臟方 取桃東南枝三七枚輕槌
頭使散以綿纏之又搗石硫黃為末將此綿纏桃枝
撚轉之令末少厚又截一短竹筒先內下部中以所
撚藥桃枝熟燃熏之

文仲療陰蝕欲盡者方 以蝦蟇兔尿等分為末傳之
良

作兩瘡深半寸余因檢得此方仍以自處蚺蛇膽散
不經七日瘡乃平復甚効凡治數十人應手而瘥請
廣布之

甘濕散

又名蚺蛇膽散

療疔蟲陰蝕

蚺蛇膽

真者

青木香

石硫黃

鐵精

麝香

各四分臨

時分之多少入緣麝香辟蛇毒若先以相和蛇膽即無力也舊用五月五日蝦蟇

右五味各等分為末更細研有患取如三棊子和井
花水日再服訖先令便利了即以後方挑枝熏下部

又方 平胃散加貫衆末每服二錢熟煮豬肝拌藥內
陰戶中

乳少

大凡婦人乳汁或行或不行者皆由氣血虛弱經絡不
調所致也乳汁勿令投於地蟲蟻食之令乳無汁若乳
盈溢可潑東壁上佳或有產後必有乳若乳雖脹而產
後覺作者此年少之人初經產乳有風熱耳須服清利
之藥則乳行若累經產而無乳者亡津液故也須服滋

狼牙湯

古今錄驗

療婦人陰蝕其中爛傷膿水淋漓臭穢

狼牙

三兩

右咬咀以水四升煮取半升去滓內苦酒如

雞子中黃大沸湯一盃消盡夜適寒溫以綿纏筋頭

大如繭濡湯以瀝瘡中日四五度即瘥

補遺治產後陰戶生瘡

青黛

黃丹

水粉

五倍子

等分
為末

用賣肉鋪上拭肉巾燒為末和前藥先以荊芥薄荷
柏葉煎湯洗淨後摻藥如瘡乾可用油調末塗之

前證若氣血虛弱而不能化生宜壯脾胃怒動肝膽而乳腫汁出宜清肝火夫乳汁乃氣血所化在上為乳在下為經若屢產無乳或太便澀滯當滋化源

漏蘆散

療乳婦氣脈壅塞乳汁不行及經絡凝滯妳

乳脹痛留蓄邪毒或作癰腫此藥服之自然內消乳

汁通行

漏蘆

二兩
半 蛇蛻

十條
炙

瓜蒌

十枚
急火
燒焦存性

右三味為末溫酒調下二錢無時候服藥後即以豬

溢之藥以動之若雖有乳却又不甚多者須服通經之藥以動之仍以羹臠引之蓋婦人之乳資於衝脈與胃經通故也有屢經產而乳汁常多者亦婦人血氣不衰使然也大抵婦人素有疾在衝任經者乳汁少而其色帶黃所生之子怯弱而多疾 三因產婦有二種乳脈不行有氣血盛而壅閉不行者有血少氣弱溢而不行者虛當補之盛當疎之盛者當用通草漏蘆土瓜根輩虛者當用煉成鐘乳粉豬蹄鯽魚之屬槩可見矣 薛

方加桂心並為末酒服方寸匕

產書下乳汁 土瓜根為末酒調服一錢日三四服

下乳汁以京三稜三箇水二碗煎至一碗洗取汁下為

度極妙

湧泉散 成都教授單驤方 療產乳無汁亦治乳結

癰腫

穿山甲

洗淨一兩
灰炒燥

為細末酒調服方寸匕

必用方云漏蘆括萋皆要藥或云多食豬蹄羹 括萋

蹄羹投之經驗方有牡蠣燒存性 一方只用牡蠣

煨末酒調

入方

葵菜子

炒香

縮砂仁

各等分

右為細末每服二錢

熱酒調下滋益氣脈榮衛行津液上蔡張不愚方常

用極有驗

產寶療產後乳無汁方

土瓜根

漏蘆

各三兩

甘草

二兩通草

四兩

右四味水八升煮取二升分溫三服忌如常法 一

又方

豬蹄

一隻

通草

四兩

水一斗煮作羹食之妙

薛一產婦因乳少服藥通之致乳房腫脹發熱作渴余謂血氣虛以玉露散補之而愈

玉露散 治乳脈不行身體壯熱疼痛頭目昏痛大便

澀滯等證

川芎

桔梗

白芷

各二錢

芍藥

當歸

各一錢半

人參

白茯苓

甘草

各一錢

右八味作一服水二鍾煎至一鍾食後服如頭熱甚

取子淨洗炒令香熟槌破取仁瓦上攤浥令白色研
為細末溫酒調下一錢服了合面卧少時未効再作
一方瓜蒌一枚熟搗以白酒一斗煮取四升去滓溫
飲一升日三

成煉鐘乳散 療乳婦氣少血衰脈澁不行乳汁絕少

成煉鐘乳粉

研細

濃煎漏蘆湯調下二錢

靈苑下乳汁立効方

粳米

糯米

各半合

萬苣子

一合並淘

淨

生甘草

半兩

用水二升煎汁一升去滓分三服立下

未先喫羊蹄汁一椀次服藥後再喫蔥絲羊羹湯少許出効

有人乳汁不行已十七日諸藥無効遇有人送赤豆一斗遂時常煮粥食之當夜乳脈通行 又方 麥門冬不拘多少去心焙為末以酒磨犀角約一錢許煖犀角酒調門冬末二錢服之不過兩服乳汁便下

乳汁自出

大產後乳汁自出蓋是身虛所致宜服補藥以止之若

大便秘者加大黃三錢

羅氏湧泉散 治婦人乳汁因氣絕少

瞿麥穗

麥門冬

去心

龍骨

穿山甲

炮黃

王不留行

各等分

右五味為細末每服一錢熱酒調下後吃豬蹄羹少

許又用木梳於左右乳上各梳三二十梳日三服依

前法

又方 治妳汁少

瓜蒌根

薄荷幹身

等分

右為粗

三兩炒熟水煎服立消其耗散血氣如此何脾胃虛弱
飲食不消方中多用之

漏蘆散

見前

吹妳

大產後吹妳者因兒喫妳之次兒忽自睡呼氣不通乳
不時洩蓄積在內遂成腫硬壅閉乳道津液不通傷結
疼痛亦有不痒不痛腫硬如石名曰吹妳若不急治腫
甚成癰產後吹妳最宜急治不爾結癰逮至死者速服

乳多溫滿急痛者溫帛熨之產實有是論却無方以治之若有此證但以漏蘆散亦可 有未產前乳汁自出者謂之乳泣生子多不育經書未嘗論及 薛前證氣血俱虛用十全大補湯肝經血熱用加味逍遙散肝經怒火用四物參朮柴梔肝脾鬱怒用加味歸脾湯 一產婦勞役忽乳汁如涌昏昧吐痰此陽氣虛而厥也灌以獨參湯而甦更以十全大補湯數劑而安若婦人氣血方盛乳房作脹或無兒飲脹痛增寒發熱用麥芽二

乳硬作痛 嫩桑葉生研以米飲調攤紙花貼腫處

補遺治產後吹妳結實腫痛 用陳皮一兩甘草一錢水二

椀煎至一椀分兩服次用荊芥羌活獨活煎湯熏洗
即散

妬乳

夫妬乳者由新產後兒未能飲之及乳不洩或乳脹掙
其汁不盡皆令乳汁蓄結與血氣相搏即壯熱大渴引
飲牢強掙痛手不得近是也初覺便知以手捋捏去汁

皂角散括萋散傳以天南星散以手揉之則散矣

薛前證用藥切不可損其氣血餘詳外科乳癰條

括萋散方

乳香

一錢研

括萋實

一箇

研勻溫酒煎服

天南星散

南星

為末

溫湯調以鷺翎蘸塗患處

皂角散

歌曰

婦人吹妳治如何皂角燒灰蛤粉和

熱酒一杯調搗字須臾揉散笑呵呵

治妳結硬疼痛

百藥煎為細末每服三錢酒一盞煎

數沸熱服

瓜蒌

一箇半
生半炒

大粉草

一寸半
生半炙

生薑

一塊半
生半煨

右三味同剉用酒一椀煮取一盞去滓服之其痛一會不可忍即搜去敗乳臨卧再一服順所患處乳側卧於床上令其藥行故也

療產後吹乳作癰

葵莖及子

右搗篩為散酒服方

寸匕即愈

又方 雞屎乾為末酒服方寸匕須臾三服愈

又方 皂角十條以酒一升揉取汁消石半兩煎成膏

更令傍人助吮引之不爾或作瘡有膿其熱勢盛必成癰也輕則為吹乳妬乳重則為癰雖有專門不可不知

連翹湯 治產後妬乳并癰

連翹 升麻 芒硝 玄參 芍藥 白欬 防

風 射干 大黃 杏仁 甘草

各一錢

右十一味作一服水二鍾煎至一鍾食後服

療產後婦乳初結脹不消令敗乳自退方

浸淫為長百種療不差者動經年月名為妬乳病婦人
飲兒者乳皆欲斷世謂苟抄乳是也宜以赤龍皮湯及
天麻湯洗之傳二物飛烏膏及飛烏散佳始作者可傳
以黃芩漏蘆散黃連胡粉散並佳

赤龍皮湯

槲皮

三升切

右以水一斗煮五升夏冷用秋冬溫之分以洗乳

天麻湯

天麻草

五升切

右以水一斗半煎取一斗隨

寒溫分洗乳以殺痒也此草葉如麻葉冬生夏著花

傳之

療乳腫將次結成癰方 右以馬溺塗之立愈

補遺療產後吹妳妬妳但未結成癰或成癰未作有膿者 用蔓荊子搗爛酒服仍以滓敷患處 又方

用赤小豆酒研爛溫酒服滓封患處 又方 仙人

掌草一握小酒糟一塊生薑一大塊同研爛入桂末少許炒酒服留滓罨患處

集驗論曰凡婦人女子乳頭生小淺熱瘡搔之黃汁出

赤如鼠尾花亦以洗浸淫黃爛熱瘡痒疽濕陰蝕瘡
小兒頭瘡洗畢傳膏散

飛鳥膏散方

用燒朱砂作水銀上黑烟

名維粉者三兩熬令焦燥

礬石

三兩燒粉

右二味以絹篩細以甲煎和之令如脂以

傳乳瘡日三作者不須和有汁自着可用散亦傳諸

熱瘡黃爛浸淫汁瘡蜜瘡丈夫陰蝕痒濕諸小兒頭

瘡疳蝕口浸淫瘡蝸瘡等並以此傳之

又黃連胡粉膏散方

黃連

兩

胡粉

二兩半

水銀

一兩同研
令消散

右三味搗黃連為末三物相和皮裏熟按之自和合

也縱不成一家且得水銀細散入粉中以傅乳瘡諸

濕痒黃爛肥瘡若着甲煎為膏千金同

補遺婦人乳頭小淺瘡爛痒以芙蓉花或葉乾為末糝

之又有人乳頭裂痛取秋後冷落茄子花裂開者

陰乾燒存性水調塗之

證治準繩卷七十